

2021

ELEKTRONIKUS LÁZLAP **rövid használati útmutató** **orvosoknak**

Készítette: Gubányi Judit, Szűcs Péter



Kedves Kollégák!

Ez az összefoglaló egy nagyon rövid verziója az ICCA/ ICIP használatának, valójában csak egy emlékeztető. A teljes használati útmutató nélkül NEM használható. A célja az, hogy aki meghallgatta a teljes verziót (ami első hallásra nagyon tömény és riasztó), felidézhesse egy kis segítséggel az ott hallottakat. Kérlek benneteket, ezzel a kitéttel használjátok. A teljes verzió elérhető a következő linken:

<https://drive.google.com/file/d/1h5D2QZwC3gIGnZ1nUOEX1blqVtoErXaL/view?usp=sharing>


Tartalomjegyzék

<i>Rendelés indítása</i>	2
<i>Gyakoriságok</i>	8
<i>Enterális táplálás rendelése</i>	13
<i>Változó dózisú gyógyszerek</i>	13
<i>Exit időpont felvitele</i>	15
<i>Kábítószer megsemmisítése</i>	19
Még egy kis könnyítés a KEK-ben dolgozóknak	20



PTE KLINIKAI KÖZPONT

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet



GYÓGYSZEREK FELÍRÁSA, VIZIT

A gyógyszer –és vizit rendelést több felületről lehet indítani, de legegyszerűbb lenyitni a „Vizitrendelési jegyzőkönyv” fület és a felső ikonsorban található „Rendelés bevitel” ikont használni (kis notesz meg toll), mert ilyenkor nem takarja el a rendelt tételeket, és azonnal látod, mi van már meg, mi kell még, plusz ha valamiről kiderül, hogy nem jó (kezdési időpont, adagolás, gyakoriság, stb.), amíg nincs elmentve (pirossal van írva), addig lehet rajta változtatni. (Mentés után is, de akkor nem a változtat, hanem egy új rendelés sort nyit, a régi 24 órán át ott marad inaktívan)

Rendelés indítása

A „Rendelés bevitel” első sorában van az, hogy melyik blokkból indítod a rendelést. A „**perfúzorral társítható gyógyszerek**” az a sor, ahol megtalálható a „szükség szerint folyamatos” gyakoriság – ez a feltétele, hogy a gyógyszer pumpával párosítható legyen. A **perfuzorban adható gyógyszereket MINDIG INNEN KELL FELÍRNI**, de figyelni kell a gyakoriságot, mert itt is ki lehet választani bármi mást is, csak a többi blokkból nem lehet a Szükség szerint folyamatos”-t.

A második sor a gyógyszer neve, itt elkezdted írni, és ha megvan a listában, rákattintasz. A harmadik sorban az adott gyógyszer van teljesen beparaméterezve, akár több verzióban is, ha arra kattintasz, semmi más dolgod nincs, kitölti a rendelést, CSAK AZ INDÍTÁSI IDŐT KELL FIGYELNI. Pl. Furon esetén van 1 mg/ml, 2 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml, ha kiválasztod a 2 mg/ml-t, beírja hogy 100 mg Furon Salsollal 50 ml-re hígítva szükség szerint folyamatos gyakorisággal a kezdő időponttól adható. A rendelői utasításban érdemes elvárt ÓD-t megadni, a nővér így tudja adagolni a gyógyszert, ill. min-max sebességet (aki szívbeteg, beírhatod, hogy 0,5 ml/h-val akkor is menjen, ha akármennyi a vizelete)

Az „**ITO összes**” blokkban van az összes használt IV gyógyszer – ebben sok átfedés van a ’perfúzorral társítható gyógyszerek’-el, nagy részük innen is rendelhető, de így nem lehet pumpában adni – ugyanígy rendelhetők gyógyszerek a perfúzoros blokkból is akár napi 3x gyakorisággal, a különbség csak a pumpa lehetőségben van. Itt IV gyógyszerek, inhalálások vannak, TABLETTA NINCS.

Az „**Egyéb**” blokkból rendelhetőek a tabletták, kúpok, szemcseppek, p.o.folyadékok, tapaszok. Fontos, hogy itt KERESNI CSAK AZ ELSŐ BETŰRE LEHET, eltérően a többi bloktól. Ez a felület még nincs teljesen kész, és a rengeteg különböző tablettá miatt valószínű soha nem is lesz teljes. Ha olyan gyógyszert kell felírni, ami nincs a listában, A BLOKK ÜRES RÉSZÉRE KELL KATTINTANI, FELAD EGY ÜRES RENDELÉSBEVITELI LAPOT, AZON BÁRMIT EL LEHET RENDELNI.

Gyógyszer felírásnál figyelni kell az indítási időre, mert az ütemezéseket ahhoz állítja be. A 8 óránként járó gyógyszerek ütemezése alapbeállításban 9-17-01 óra – ha 9:02-kor indítod el, és szeretnéd, ha azonnal megkapná, arra a napra csak 1 db időpont marad (a 17 óra), és ha annak átírja az ápoló a rögzítési idejét, akkor többször nem tud gyógyszert jelölni. A következő időpont másnap 01 óra. Szóval indítási idő lehetőség szerint 8 óra, illetve ha valamelyik gyógyszer utólag lett felírva, azt addigra kell visszadatálni, amikor indult (vg alapján K-pótlás mondjuk 15-től, vagy tachycardia miatt Magnézium beadása, beírhatod a 19 órai viziten is, de korábbi indítással, mert különben csak akkorra tudják rögzíteni, amikor már le is folyt, 19 órára vagy későbbre)

Az indítási idő NEM JELENTI AZT, HOIGY A GYÓGYSZERT BE KELL ADNI ABBAN AZ IDŐBEN, csak lehetőséget nyújt arra, hogy korábban is rögzítsék, mert aktív a sor.

Ha rögzítve van allergia, az minden lapon jól látható, a gyógyszer felírásakor is.

Philips IntelliSpace CCA - [ATI - ITO 3 - Teszt Piroska | KBA - Életkor felvételtkor (számított): 108 | Kezelőorvos: [Újrálásztésre vonatkozó állapot]]

Fájl Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súgó Judit Gubányi

ITO 3 - Teszt Piroska

Felvételi dokumentumok Monitor paraméterek Folyadéklap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevitel Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv Gyógyszerek áttekintése Vízitrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Összefoglalás

Vízitrendelési jegyzőkönyv Allergiák: **Penicillin/cefalosporinok - Van allergiája** Felvételi testsúly: • Testmagasság (cm): • BSA:

Vízitrendelési jegyzőkönyv : Mind 2019.01.18. 2019.01.19. 2019.01.20. 2019.01.21. 2019.01.22. 2019.01.23. 2019.01.24. 2019.01.25. 2019.01.26.

[24 óránként] Közvetlen orvosi bevitel 0:00 - 23:59 0:00 - 23:59 0:00 - 23:59 0:00 - 23:59 0:00 - 23:59 0:00 - 23:59 0:00 - 23:59 0:00 - 23:59 0:00 - 23:59

Mind
Laboratóriumi vizsgálatok
Diagnosztikai tesztek/eljá...
Légzés
Diéta
Beteg-/család gondozás
Egyéb

Új rendelések megadása

Allergiák: **Penicillin/cefalosporinok - Van allergiája** Felvételi testsúly: • Testmagasság (cm): • BSA:

Mód: Közvetlen orvosi bevitel

1.

2.

3.

Újabb hozzáadása OK Mégse

Antibiotikum felírásakor lehetőség van rá, hogy a „Rendelői utasítások” részben odaírd, milyen leoltás és milyen kórokozó alapján indult épp az az AB (ha csak később lesz leoltás, de jó a gyógyszer, ez később is rögzíthető a rendelésben)

NAGYON FONTOS, hogy a gyógyszerek automatikusan **NEM ÁLLNAK LE** (kivéve ha beírom a leállítási időpontot, (ami hasznos Fluimucil ill., HALb és Aminoven esetén), hanem a **LEÁLLÍTÁSIG FOLYAMATOSAN EL VANNAK RENDELVE, BEADHATÓAK!!**

Moxifloxacin leállítva, eredetileg 18-kor még ment volna, megkérdezi, hogy biztos ezt akarod-e, ha jóváhagyod, leáll, helyette indult a Tazocin.

(lásd következő oldal)

Felírásakor megadható a gyógyszer leállítási ideje, ha biztosan tudom, meddig adom. Ez akár 3-5 nap is lehet, pl. 3 napos HALb esetén beírok egy 3 nappal későbbi dátumot, ha a sebész csak 1 napig kéri az AB-ot, azt is leállíthatom másnapi dátummal, akkor nem „ragad be” a rendelés.

Fájli Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súgó Judit Gubányi

ITO 8

Felvételi dokumentumok Monitor paraméterek Folyadéknap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevétele Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv Gyógyszerek áttekintése Vízirendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Összefoglalás

Vízirendelési jegyzőkönyv Allergiák: Felvételi testsúly: • Testmagasság (cm): • BSA:

Vízirendelési jegyzőkönyv : Mind

	2019.01.18.	2019.01.19.	2019.01.20.	2019.01.21.	2019.01.22.	2019.01.23.	2019.01.24.
[24 óránként]	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59
Isolyte							
Laboratóriumi v: Holnap reggel 7:00-kor reggeli labor: vk, vg, ion,...		✓ itt: 6:00					
Laboratóriumi v: Ma délben vg							
Laboratóriumi v: Ma este 18:00 vg							
▶ Magnézium (Cormagnesin) 4 g IV Azonnal							
▶ Magnézium (Cormagnesin) 8 g IV Sz. sz. f.							
▶ Metamizole (Algopyrin) 1000 mg IV Szüksé napi 3X							
▶ Metoclopramid (Ceruleal) 10 mg IV 8 óránként							
▶ Nadroparin (Fraxiparine) 5700 E SC 12 óránként							
Noradrenalin 4 mg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat							
⚠ Pantoprazol (Controloc) 40 mg IV 12 óránként							
▶ Paracetamol (Perfalgan) 1000 mg IV Szüksé 4X/nap							
▶ Pip/Tazo (Tazocin) 4,5 g IV 8 óránként							
Propofol 1000 mg in 50 ml Gyári oldószer							
Sterofundin B							
Sufentanyl 50 µg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat		5 itt: 23:00	Beadva itt: 13:02				
▶ T. Concor 2,5 mg Egyéb Naponta 1x reggel							
Képpalkotó vizsg: Mellkas Röntgen Ma		✓ itt: 10:00					
Moxifloxacin (Avelox) 400 mg IV 24 óránként		✓ 400 itt: 18:00					

Rendelésütemezés jóváhagyása

Moxifloxacin (Avelox) 400 mg IV 24 óránként

Moxifloxacin (Avelox) 400 mg IV 24 óránként

2019. január 18.

✓ 18:00 - ✓
Beadások leálltak

Ellenőrizzen minden rendelést, és erősítse meg, hogy az időközök és a gyakoriságok helyesek.

Jóváhagyja ezeket a módosításokat?

Jóváhagyás Mégse

Viziten figyelni kell, ha volt „Isolyte szükség szerint 500 ml”, de a beteget a száraz oldalon kell tartani, LE KELL ÁLLÍTANI a szükség szerinti plusz folyadékot, mert így beadható. Tehát azt is meg kell nézni viziten, mi az, ami nem kell, és azt le kell állítani (a „Vizitrendelési jegyzőkönyv” –ben a rendelést megnyitva a gyógyszert visszamenőleg is le lehet állítani, a rendszer felajánlja az utolsó beadás időpontját, de annál későbbi időpont is lehet, de korábbi nem.)

Ha a „Vizitrendelési jegyzőkönyv”-ben jobb egér gomb-Megszakítás módszerrel állítod le a gyógyszert, az az AKTUÁLIS IDŐPONTBAN ÁLLÍTJA LE A RENDELÉST, ha más időpontot szeretnél, ugyanitt be kell menni a rendelésbe, ott beállítható más idő is.

Azért érdemes a „Vizitrendelési jegyzőkönyv” fölön rendelni, mert ott láthatóak a már elrendelt gyógyszerek, eljárások, laborok, minden. A „**Rendelések**” lapon az újonnan elrendelt gyógyszerek és egyébek vannak, **NEM LÁTSZIK A MÁR MEGLEVŐ RENDELÉS**, így sokszor előfordul dupla vagy tripla elrendelés. A vérgáznál csak bosszantó, amikor gyakorlatilag óránként kellene venni, mert van 4 db elrendelés 6 óránkénti gyakorisággal, különböző kezdéssel, és valamelyik rendelés alapján óránként kellene nézni, de AB esetén zavaró, ha a „vizitrendelési jegyzőkönyv”-ben megnézed, hogy mióta megy az adott gyógyszer, az látszik, hogy 3 napos, a „Gyógyszerek áttekintése” fölön viszont látszik, hogy ment 2 napig, újra elrendelték, a régit leállították, ment 1 napig, aztán ugyanez 4x, végülis kiderül, hogy nem 3 napja megy, hanem 10. Na ez már nem mindegy.

A másik, ami miatt ezt a lapot érdemes használni, hogy végig kell nézni reggelente a rendeléseket, mert „beragadnak” olyan rendelt tételek, amik már nem aktuálisak (intubált betegnél légzési fizio TriFlow, több mellkascsővel rendelkező betegnél PICCO rázó mellény, nem mozgatható betegnél elfordítás). Emlékezz rá, AMIT NEM ÁLLÍTASZ LE, AZ AKTÍV RENDELÉS!

A papír lázlapnál sem egy üres lapod van csak, hanem nézed az előző napi lázlapot, onnan döntöd el, mit írsz át, mit nem. Itt is meg kell nézni, de ha semmit nem kell leállítani, és nincs új gyógyszer, akkor semmi dolgod nincs. De ellenőrizni mindenképp kell.

Gyakoriságok

Az elrendelt gyakoriságok (x óránként) a rendszerben rögzítve vannak, ha az indítási idő az első időpont UTÁNI, a gyógyszerből eggyel kevesebb adag adható be (lásd feljebb), ezért kell a felírást visszadatálni az ütemezési idő előtti időpontra.

A kezdő időponttól kezdve az elrendelt időközönként ütemezi, a lázlapon „**függőben**”, ha már elmúlt az időpont, „**késik**” jelzéssel látszanak.

Különbség a „8 óránként” és a „Napi 3x”) között: a 8 óránkénti ütemezéskor EGY IDŐPONTOT ADSZ MEG, a rendszer a következő időpontot MINDIG adott órával későbbre teszi. Tehát „8 óránként” ütemezett idő 9 óra, ha ezt az adagot beadom, megjelenik a következő ütemezett idő 17 óra, és mindegy csak a következő időpontot látom. Nővér kompetenciával át tudom írni a „beadási idő”-t, de ha 17 helyett 16 órakor adod, A KÖV. IDŐPONT AKKOR IS 01 ÓRA.

A napi 2x, napi 3x stb. gyakoriságoknak van egy alap beállítása (pl. a napi 2x a reggel 8 és este 20 , A NAPI 3X 9-17-01 óra), de ilyenkor 2, 3, 4 VAGY TÖBB IDŐPONTOT KAPOK, AMIK EGYENKÉNT VÁLTOZTATHATÓAK.. Ha olyan gyógyszert írsz fel, ami reggel és délben kell, át lehet írni 8 és 12 órára, ha éber betegnek tablettás gyógyszer van felírva, vagy valamilyen tevékenységről van szó, mint a PICCO mellény vagy ágy szélére ültetés, azokat nappalra ütemezzük (az időpont 7-15-21 óra, vagy más ízlés szerinti időpont), hogy a beteget éjjel emiatt ne kelljen ébreszteni. Ez nem azt jelenti, hogy ha fullad a beteg, nem fiziózzuk meg, vagy nem ültetjük ki, de ha alszik, nem ébresztjük fel.

A „szükség szerint” gyakoriságok a folyadék lapon NEM LÁTSZÓDNAK. A felírt gyógyszer neve látható, de nincs ütemezett időpont.

Amire még figyelni kell: a lázlap nem értelmezi a „Rendelési utasítás” vagy „Egyéb utasítás” helyre írt szöveges részeket. Tehát a ma délután „12 óránként „ gyakorisággal felírt gyógyszer mellé hiába írod oda, hogy „holnap reggeli kezdéssel”, a lázlap az első időpontot AZNAP 21 ÓRÁRA ÜTEMEZI. Ez csak az élő személyzetnek jelent információt, a rendszernek nem. Ilyenkor a rendelés: x gyógyszer , gyakoriság 12 óránként, **kezdés 05.15 14:23 óra, ütemezett időpont 05.16 09:00 óra** (átírható bármilyen időpontra, max 24 órára előre).

A „Rendelés bevitel” esetén vannak *-al jelölt részek, ezek változtatása esetén új rendelés generálódik, a régi megszakad az új rendelés indulásával. Ezért ha dózist változtatok (Cordarone, Noradrenalin), NEM ÚGY CSINÁLOM, HOGY A RÉGI REDNELÉSBEN ÁTÍROM AZ ADAGOT, mert akkor AZONNAL leáll a régi. Cordarone is általában úgy van, hogy kifogyásig megy az egyik adag, utána indul a másik. Célszerű új rendelést indítani, így mindkettő aktív, amíg nem fogy ki a pumpa, a z egyik dózishoz van rögzítve a perfuzor, ha kicserélem, a másikhoz rendelem hozzá. Utána a régit le lehet állítani.

Kálium esetén sem célszerű csak az adagot változtatni, mert senki nem nézi, hogy írja át a volument is, és a rendszer rossz töménységgel számol. Ha be van írva 4 g 40 ml-ben 4 óra alatt, az 0,1g/ml, 4 óra alatt 10 ml/h-val 4g. Ha csak a 4g-ot írod át 6g-ra, a töménység 1,5 ml/h lesz, 6 óra alatt 10 ml/h-val az adag 9g, ami nem valós. Legyegegyszerűbb ilyenkor a „rendelői utasítás” sort használni, oda írni, hogy „05.15 11-kor 4g”, ha később kell, „05.15 20-kor 3g”, ilyenkor nem változik a rendelés, és mindegy, hogy eredetileg mennyi volt felírva, mert úgyis annyit rögzít a rendszer, amennyit valójában megkapott a beteg.

Ha vizit rendelést viszek be (TX után 2 óránként vc ellenőrzés, vérző betegnél óránként drain ellenőrzés), a „Vizit rendelés ápolók számára” – „Szabad szöveges rendelés” fülön tehetem meg. Vigyázni kell, hogy a szövegbe beírt gyakoriság **NEM JELENT TÉNYLEGES GYAKORISÁGOT, AZT A RENDSZER NEM TUDJA KEZELNI.** A szöveges részbe beírom, hogy „drain ellenőrzés óránként”, és a gyakoriságban megadom az „1 óránként” gyakoriságot, akkor ütemezi a rendszer, és lehet jelölni, hogy elvégezték . A drain hozamát ide NEM LEHET BEÍRNI, azt a „Folyadék lap”-on a hozzáadott sorok „Drain” sorban lehet, onnan a rendszer az egyenleg részének tekinti, és a kimenő folyadékokhoz adja.

Ugyanez orvosok számára: „PICCO mérés 3x”, gyakoriság „amint lehet” (a rendszer ezt adja meg alap gyakoriságnak a szöveges rendelésnél) – ilyenkor a beírt időpontra lesz egy rendelésed, amin PICCO mérés 3x” szerepel, de csak azt az egyet tudod kipipálni, NINCS TÖBB IDŐPONT. A jó rendelés:

„PICCO mérés 3x”, gyakoriság 8 óránként vagy 3x (3 különböző időponttal, amik állíthatóak)

KÜLÖNBSÉG AZ „AZONNAL” ÉS „AMINT LEHET” KÖZÖTT: az „amint lehet” gyakoriság időpontját tudod változtatni, tehát „CVK behelyezés amint lehet, kezdés 05.15 11:13”, ha a gyakoriság „azonnal”, akkor csak kipipálni tudod 11:13-ra, akkor is, ha csak 15 órakor teszed be., Ha a gyakoriság (amint lehet), megadja a 11:13-as időpontot, de a rögzítés ideje átírható bármikorra.

Még valami: az „Azonnal” és az „Amint lehet” gyakoriság EGYETLEN BEVITELI ALKALMAT JELENT, tehát ha azt akarod, hogy egy fájdalom csillapítót kapjon a beteg, és az első adagot azonnal, GYAKORISÁG „SZÜKSÉG SZERINT”, A RENDELÉSI UTASÍTÁSBA LEHET BEÍRNI, HOGY „AMINT LEHET”, mert az „Amint lehet” gyakorisággal elrendelt gyógyszert egyszer megkapja, és azon a rendelésen belül nincs lehetőség újabb beadásra, újra el kell rendelni, ha tovább is szeretnéd adni.

Philips IntelliSpace CCA - [ATI - Nincs ágy - Teszt Piroska | KBA: | Életkor felvételkor (számított): 108 | Kezelőorvos: | Újralesztésre vonatkozó állapot.]

Fájl Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súgó Judit Gubányi

Teszt Piroska

Felvételi dokumentumok Monitor paraméterek Folyadéknap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevitel Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv Gyógyszerek áttekintése Vízrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények

Vízrendelési jegyzőkönyv Allergiák: **Penicillin/cefalosporinok - Van allergiája** Felvételi testsúly: • Testmagasság (cm): • BSA:

Vízrendelési jegyzőkönyv : Mind
[24 óránként] Közvetlen orvosi bevitel

	2019.01.20. 0:00 - 23:59	2019.01.21. 0:00 - 23:59	2019.01.22. 0:00 - 23:59	2019.01.23. 0:00 - 23:59	2019.01.24. 0:00 - 23:59	2019. 0:00
drainek ellenőrzése óránként		<input type="checkbox"/> 19:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 20:00 <input checked="" type="checkbox"/> <i>itt: 21:00</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>itt: 22:00</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>itt: 23:00</i>	<input type="checkbox"/> 5:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 6:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 7:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 8:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 9:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 10:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 11:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 12:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 13:00			
▶ Enteralis tápszerek, szondatápok rendelése DIBEN 30 ml/óra						
▶ Enteralis tápszerek, szondatápok rendelése Víz, folyadék 10 ml/óra						
Inzulin (Actrapid) 50 E in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat						
▶ Noradrenalin 20 mg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat						
⚠ Pantoprazol (Controloc) 40 mg IV 12 óránként	<input type="checkbox"/> 8:00 - késik <input type="checkbox"/> 20:00 - késik	<input checked="" type="checkbox"/> <i>40 itt: 8:00</i> <input type="checkbox"/> Függőben itt: 20:00	<input type="checkbox"/> Függőben itt: 8:00			
▶ T. Xanax 0,25 mg Egyéb Naponta 2X	<input type="checkbox"/> 8:00 - késik <input type="checkbox"/> 15:00 - késik	<input type="checkbox"/> 8:00 - késik <input type="checkbox"/> Függőben itt: 15:00	<input type="checkbox"/> Függőben itt: 8:00			
▶ T. Xanax 0,5 mg Egyéb Naponta 1x este	<input type="checkbox"/> 22:00 - késik	<input type="checkbox"/> Függőben itt: 22:00				
vc mérése	<input type="checkbox"/> 1:00 - késik <input type="checkbox"/> 3:00 - késik <input type="checkbox"/> 5:00 - késik	<input checked="" type="checkbox"/> <i>itt: 1:00</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>itt: 3:00</i> <input type="checkbox"/> 5:00 - késik	<input type="checkbox"/> Függőben itt: 1:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 3:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 5:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt:			

Itt csak a rendelés elvégzését lehet dokumentálni, a drain hozama a folyadék lapon látszik.

Enterális táplálás rendelése

Ha nem szondatápot írok a betegnek (azt a rendszer automatikusan hozzáadja a bemenő folyadékhoz), hanem szájon át menüt, az a rendszer számára csak SZÖVEGES FILE, NEM KEZELI MENNYISÉGGÉNT. A per os menünél (ill. minden enterális menünél) mindenképp kell egy plusz sor „víz, folyadék” néven. A menü sorban szöveget írhatok be (leves, rántott hús, bármi), a „víz, folyadék” sorban CSAK mennyiség írható, ami az egyenleg pozitív oldalára kerül, ott a bevitt ételt nem lehet nevesíteni. Tehát bármilyen enterális táplálás során KELL EGY PLUSZ „VÍZ, FOLYADÉK” SOR.

Változó dózisú gyógyszerek

(pl. Cordarone, Colomycin)


Ez már volt feljebb is: érdemes mindig új rendelést bevinni a másik adaggal, az természetesen nem jelenti, hogy onnan indul a gyógyszer, de ATTÓL AZ IDŐPONTTÓL KEZDVE BÁRMIKOR INDÍTHATÓ (akár Noradrenalin, napközben felírva hogy MAP<65 esetén, akkor éjjel nem kell ezzel foglalkozni, a nővér elindíthatja, ha fel van írva akár éjjel 3-kor külön kérdés nélkül)

(Xanax, Tiapridal)

Ezeket a papír lázlapra fel lehet írni 100-100-200 mg formában (08-15-22 órakor), az elektromos lázlapon 2 sorban tudom csak felvinni:

100 mg napi 2x (vigyázni kell, ez reggel-este gyakoriságot jelent, az ütemezést át kell írni 8 és 15 órára), valamint 200 mg napi 1x este (ütemezés: 22 óra)

Ez megkerülhető, ga a „Rendelői utasításban” fel van írva, hogy „este 0,5 mg” vagy „este 200 mg”, így a nővér átírja az adagot.



- Vizitrendelési jegyzőkönyv**
- Mind
- Laboratóriumi vizsgálatok
- Diagnosztikai tesztek/eljá...
- Légzés
- Diéta
- Beteg-/családgondozás
- Egyéb

Allergiák: **Penicillin/cefalosporinok - Van allergiája** Felvételi testsúly: • Testmagasság (cm): • BSA:

Vizitrendelési jegyzőkönyv : Mind		2019.01.18.	2019.01.19.	2019.01.20.	2019.01.21.	2019.01.22.	2019.01.23.
[24 óránként] Közvetlen orvosi bevitel ▾		0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59
<i>EKG Ma</i>							
<i>Enteralis tápszerek, szondatápok rendelése DIBEN 30 ml/óra</i>							
<i>Enteralis tápszerek, szondatápok rendelése Vízfolyadék 10 ml/óra</i>							
<i>Inzulin (Actrapid) 50 E in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat</i>							
<i>Laboratóriumi v: Azonnal felvételi labor: ion, vese,...</i>							
<i>Noradrenalin 20 mg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat</i>							
<i>Pantoprazol (Controloc) 40 mg IV 12 óránként</i>							
<i>T. Xanax 0,25 mg Egyéb Naponta 2X</i>							
<i>T. Xanax 0,5 mg Egyéb Naponta 1x este</i>							
<i>vc mérése</i>							

Ha bármilyen gyógyszerből fel kell írni az elrendelt mennyiség mellé plusz szükség szerint valamennyit (vérnyomás csökkentő tablettá, nyugtató, bármilyen egyéb), azt külön sorban „x mg szükség szerint, RR>170 esetén” gyakorisággal kell felírni, ez **bármikor adható, ha a „rendelői utasítás’-ba írod be, csak a megadott, ütemezett időpontban kaphat nagyobb adagot, ahogy az ütemezés engedi** (lehet előbb vagy később, de napi felírt adagnál többet nem adhatnak)

Exit időpont felvitele

Monitor paraméterek → sorok hozzáadása → monitor → exitus letalis

JTI - ITO 2 - GYORS felvétel | Életkor: | Kezelőorvos: | Dg: | Spec. állapot vércsoport: |
 Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Sütő Judit Gubányi

Monitor paraméterek Folyadéklap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevétele Gyógyszerek áttekintése Vízrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Covid PCR Reláció

Észlelőlap (pte ito) 2021.05.19. 2021.05.20.

[Auto-adatrögzítés 5 percnként] 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

- Pulzusszám...
- Y NBP
- T Art. vérnyo...
- Hőmérsékl...
- SpO2
- Légzésszám
- Szívfrekven...

250
200
150
100
50
0

Szívfrekvencia
Pulzusszám
Légzésszám
Art. vérnyomás
NBP
SpO2
Hőmérséklet (C)
ICP
Oxigénterápia
FI02 (beállított)
Flow
PEEP
Lélegeztetési mód
FI02
EtCO2
Vt (beállított)
Légzési térfogat (tényleges)
Kilégzési perctérfogat
Légzésszám
Légúti légzésszám
Teljes ágyfűrdő + testi

Sorok hozzáadása és eltávolítása

Sor hozzáadás/megszakítás ideje: 2021.05.20. 11:24 Időt módosít...

Egyes sorok Sortípusok

Elérhető sorok

- Monitor adatok grafikon
- Monitor
 - Bőr hőmérséklet
 - Mag hőmérséklet
 - CVP
 - IAP (intra abdominális nyomás)
 - ABP (arterial blood pressure)
 - Exitus letalis
 - Egyéb
- PICCO adatok grafikon
- PICCO
- Lélegeztetés grafikon
- Oxigénterápia
- Lélegeztetés
- Neurológia
- Score
- Kezelések

Hozzáad >

< Eltávolít

Keresés Keresés

OK Mégse

Időpont módosítása az esemény időpontjára

I - ITO 2 - GYORS felvétel | Életkor: | Kezelőorvos: | Dg: | Spec. állapot vércsoport:]
 beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Sűgő Judit Gubányi

itor paraméterek Folyadéklap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevittele Gyógyszerek áttekintése Vizitrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Covid PCR Reláció

Észlelőlap (pte ito) 2021.05.19. 2021.05.20. 05:00

[Auto-adatrögzítés 5 percenként] 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

- Pulzusszám...
- NBP
- Art. vérnyo...
- Hőmérsékl...
- SpO2
- Légzésszám
- Szívfrekven...

250
200
150
100
50
0

Szívfrekvencia

Pulzusszám

Légzésszám

Art. vérnyomás

NBP

SpO2

Hőmérséklet (C)

ICP

Oxigénterápia

FiO2 (beállított)

Flow

PEEP

Lélegeztetési mód

FiO2

EtCO2

Vt (beállított)

Légzési térfogat (tényleges)

Kilégzési perctérfogat

Légzésszám

Légúti légzésszám

Teljes ágyfűrdő + testi
hiqiéné

Sorok hozzáadása és eltávolítása

Sor hozzáadás/megszakítás ideje: 2021.05.20. 11:24 **Időt módosít...**

Egyes sorok Sortípusok

Elérhető sorok **Észlelőlap (pte ito)**

- Monitor adatok grafikon
- Monitor
 - Bőr hőmérséklet
 - Mag hőmérséklet
 - CVP
 - IAP(intra abdominális nyomás)
 - ABP (arterial blood pressure)
 - Exitus letalis
 - Egyéb
- PICCO adatok grafikon
- PICCO
- Lélegeztetés grafikon
- Oxigénterápia
- Lélegeztetés
- Neurológia
- Score
- Kezelések

Idő és dátum

Idő: 10:27 2021.05.20.

Óra: Perc:

10:00	2021.05.20.	00
11:00	2021.05.20.	05
12:00	2021.05.20.	10
13:00	2021.05.20.	15
14:00	2021.05.20.	20
15:00	2021.05.20.	25
16:00	2021.05.20.	30
17:00	2021.05.20.	35
18:00	2021.05.20.	40
19:00	2021.05.20.	45
20:00	2021.05.20.	50
21:00	2021.05.20.	55

OK Mégse

Keresés Keresés

OK Mégse

Mentés után megjelenik a sor

T1 - ITO 2 - GYORS felvétel | Életkor: | Kezelőorvos: | Dg: | Spec. állapot vércsoport:]
 Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súgó Judit Gubányi

Monitor paraméterek Folyadéklap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevitele Gyógyszerek áttekintése Vizitrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Covid PCR Reláció

Észlelőlap (pte ito) 2021.05.19. 2021.05.20.

[Auto-adatrögzítés 5 percenként] 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Pulzusszám... 250
 Y NBP 200
 T Art. vérnyo... 150
 Hőmérsékl... 100
 SpO2 50
 Légzésszám 0
 Szívfrekven...

Pulzusszám												
Légzésszám												
Art. vérnyomás												
NBP												
SpO2												
Hőmérséklet (C)												
ICP												
PAR (HR*CVP)/MAP												
Oxigénterápia												
FI02 (beállított)												
Flow												
PEEP												
Lélegeztetési mód												
FI02												
EtCO2												
Vt (beállított)												
Légzési térfogat (tényleges)												
Kilégzési perctérfogat												
Légzésszám												
Légúti légzésszám												
Teljes ágyfűrdő + testi hiniéná												

Sorok hozzáadása és eltávolítása

Sor hozzáadás/megszakítás ideje: 2021.05.20. 10:29 Időt módost...

Egyes sorok Sortípusok

Elérhető sorok

- Monitor adatok grafikon
 - Monitor
 - Bőr hőmérséklet
 - Mag hőmérséklet
 - CVP
 - IAP (intra abdominális nyomás)
 - ABP (arterial blood pressure)
 - Egyéb
 - PICCO adatok grafikon
 - PICCO
 - Lélegeztetés grafikon
 - Oxigénterápia
 - Lélegeztetés
 - Neurológia
 - Score
 - Kezelések

Észlelőlap (pte ito)

- Monitor adatok grafikon
 - Monitor
 - HR
 - Pulzusszám
 - Légzésszám
 - Artériás vérnyomás
 - Nem invazív vérnyomás
 - SpO2
 - Hőmérséklet (C)
 - ICP
 - Exitus letalis
 - Pressure Adjusted Heart Rate ((HR*CVP)
 - PICCO adatok grafikon
 - PICCO
 - Lélegeztetés grafikon
 - Oxigénterápia
 - Lélegeztetés
 - Neurológia
 - Score
 - Kezelések

Hozzáad >

< Eltávolít

Keresés


OK Mégse

Még egy kis könnyítés a KEK-ben dolgozóknak

Már elérhető a COVID rendelési panel, ami tartalmazza a protokoll szerinti összes gyógyszert, eljárást, beavatkozást – a változó dózisú gyógyszereknél külön felírva a telítő és a fenntartó adagot. Az indítási időt veszi első napnak, ahhoz képest írja ki a csökkentett fenntartó dózisokat, tehát ha a beteg más COVID osztályról érkezett, és nem most kezdődik a kezelés, csak ki kell törölni a nem kívánt tételeket.

A rendelés menete:

rendelés bevitel → új rendelés megadása → rendelés csoportok



The screenshot shows a medical software interface with a schedule table and a dialog box for creating new orders.

Schedule Table:

2021.05.17.	2021.05.18.	2021.05.19.	2021.05.20.	2021.05.21.	2021.05.22.	2021.05.23.	2021.05.24.
0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59		

Új rendelések megadása Dialog Box:

- Allergiák: Spec. állapot vércsoport: • Dg: • :: • :: • :: • :: • ::
• :: • Study no.:
- Mód: Közvetlen orvosi bevitel
- 1. [Rendelés csoportok]
- 2. Perfúzorral társítható gyógyszerek
ITO össz.gysz.
- 3. Egyéb gyógyszer
Egyéb gyógyszer(feltöltés alatt)
Infúziók
Plazma expander
Parenterális tápszerek rendelése
Vérkészítmény
Enteralis tápszerek, szondatápok rendelése
Diéta, enteralis menü rendelése
Vizitrendelés orvosok számára
Vizitrendelés ápolók számára
- Újabb hozzáadása OK Mégse

O 4 - GYORS felvétel | Életkor: | Kezelőorvos: | Dg: | Spec. állapot vércsoport:]

g/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súgó Judit Gubányi

paraméterek Folyadéklap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevitel Gyógyszerek áttekintése Vizitrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Covid PCR Reláció

Allergiák: Spec. állapot vércsoport: • Dg: • ;: • ;: • ;: • ;: • ;: • ;: • ;: • Study no.:

Vizitrendelési jegyzőkönyv : Mind	2021.05.16.	2021.05.17.	2021.05.18.	2021.05.19.	2021.05.20.	2021.05.21.	2021.05.22.	2021.05.23.	2021.05.24.
[24 óránként] Közvetlen orvosi bevitel	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59

Új rendelések megadása

Allergiák: Spec. állapot vércsoport: • Dg: • ;: • ;: • ;: • ;: • ;: • ;: • Study no.:

Mód: Közvetlen orvosi bevitel

1. [Rendelés csoportok]

2. []

3. COVID rendeléscsoport
 osz. Felv. Égett beteg
 osz. Felv. Műtét általános...
 osz. Felv. Műtét Aortobifem. Bypass
 osz. Felv. Műtét Art. Carotis EEA, TEA
 osz. Felv. Műtét hasi kis műtét
 osz. Felv. Műtét hasi nagy műtét
 osz. Felv. Műtét hasnyálmirigy
 osz. Felv. Műtét máj
 osz. Felv. Műtét medence
 osz. Felv. Műtét Pulmonectomia

Újabb hozzáadása OK Mégse

Itt kiválasztod a COVID rendelés csoportot

Ez beadja az összes rendelési tételt

rendelések Rendelés bevittele Gyógyszerek áttekintése Vízrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Covid PCR Reláció

ort: • Dg: • :: • :: • :: • :: • Study no.:

	2021.05.16.	2021.05.17.	2021.05.18.	2021.05.19.	2021.05.20.	2021.05.21.	2021.05.22.
Közvetlen orvosi bevitel	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59

COVID rendeléscsoport

- Aszkorbinsav 1000 mg IV Naponta 3X
- Tiamin (B1 vitamin) 200 mg IV Naponta 2X
- Colecalciferol tbl Tabletta 2000 E Naponta 1x reggel
- Favipiravir tbl (Favipiravir) Tabletta 1600 mg Naponta 2X
- Favipiravir tbl (Favipiravir) Tabletta 600 mg Naponta 2X..
- Dexamethazone (Dexa) 6 mg in 100 ml 0,9% NaCl Norm.
- Remdesivire (Remdesivir) 200 mg in 250 ml 0,9% NaCl N
- Remdesivire (Remdesivir) 100 mg in 250 ml 0,9% NaCl N
- Pantoprazol (Controloc) 40 mg IV 12 óránként
- Enoxaparin (Clexane) 60 mg SC 12 óránként
- Sufentanyl 50 µg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat ; 50
- Paracetamol (Perfalgan) 1000 mg in 100 ml Gyári oldósze
- Metamizole (Algopyrin) 1000 mg in 2 ml 0,9% NaCl Norm
- Isolyte @ 80 ml/óra
- Isolyte
- Laboratóriumi v: labor covid nagyrutin
- Laboratóriumi v: labor covid kisrutin
- Képkalkotó vizsg: Mellkas Röntgen Amint lehet
- CVK behelyezése Amint lehet
- Art. kanül behelyezés Amint lehet
- HFNO, vagy CPAP NIV...
- Laboratóriumi v: labor covid38 C° feletti láz
- Hasrafordítás
- Laboratóriumi v: Vérgáz
- Na-Heparin 25000 E Inhalálás Naponta 4X
- Képkalkotó vizsg: Mellkas CT Amint lehet
- Mikrobiológiai v:Haemocultura Amint lehet
- Mikrobiológiai v:SARS-CoV-2 PCR Amint lehet
- Mikrobiológiai v:BioFire Amint lehet

Kezdés ideje
2021.05.17. 14:16

Időt módosít...

Rendelés részletek
Aszkorbinsav 1000 mg IV Naponta 3X

ITO össz.gysz.

Gyógyszer	* Aszkorbinsav
Gyógyszerforma	* C-vitamin Inj.
Beadási út	* IV
Adag	* 1000 mg
Max. adag	
Bázis oldat	0,9% NaCl Normál sóoldat
Bázis térfogat	100 ml
Gyakoriság	* Naponta 3X
Rendelői utasítások	
Napok száma	
Beadások száma	
Indítás	2021.05.17. 14:16
Leállítás	
Ütemezés idő	
Ütemezés 1	
Ütemezett idő	1:00
Ütemezés 2	
Ütemezett idő	9:00
Ütemezés 3	

Befejezés Mégse

rendelések Rendelés bevittele Gyógyszerek áttekintése Vízrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Covid PCR Reláció

ort: • Dg: • :: • :: • :: • :: • Study no.:

	2021.05.16.	2021.05.17.	2021.05.18.	2021.05.19.	2021.05.20.	2021.05.21.	2021.05.22.
Közvetlen orvosi bevitel	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59

COVID rendeléscsoport

- Aszkorbinsav 1000 mg IV Naponta 3X
- Tiamin (B1 vitamin) 200 mg IV Naponta 2X
- Colecalciferol tbl Tabletta 2000 E Naponta 1x reggel
- Favipiravir tbl (Favipiravir) Tabletta 1600 mg Naponta 2X
- Favipiravir tbl (Favipiravir) Tabletta 600 mg Naponta 2X..
- Dexamethazone (Dexa) 6 mg in 100 ml 0,9% NaCl Norm.
- Remdesivire (Remdesivir) 200 mg in 250 ml 0,9% NaCl N
- Remdesivire (Remdesivir) 100 mg in 250 ml 0,9% NaCl N
- Pantoprazol (Controloc) 40 mg IV 12 óránként
- Enoxaparin (Clexane) 60 mg SC 12 óránként
- Sufentanyl 50 µg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat ; 50
- Paracetamol (Perfalgan) 1000 mg in 100 ml Gyári oldósze
- Metamizole (Algopyrin) 1000 mg in 2 ml 0,9% NaCl No
- Isolyte @ 80 ml/óra
- Isolyte
- Laboratóriumi v: labor covid nagyrutin
- Laboratóriumi v: labor covid kisrutin
- Képkalkotó vizsg: Mellkas Röntgen Amint lehet
- CVK behelyezése Amint lehet
- Art. kanül behelyezés Amint lehet
- HFNO, vagy CPAP NIV...
- Laboratóriumi v: labor covid38 C° feletti láz
- Hasrafordítás
- Laboratóriumi v: Vérgáz
- Na-Heparin 25000 E Inhalálás Naponta 4X
- Képkalkotó vizsg: Mellkas CT Amint lehet
- Mikrobiológiai v:Haemocultura Amint lehet
- Mikrobiológiai v:SARS-CoV-2 PCR Amint lehet
- Mikrobiológiai v:BioFire Amint lehet

Kezdés ideje
2021.05.17. 14:16

Időt módosít...

Rendelés részletek
Aszkorbinsav 1000 mg IV Naponta 3X

ITO össz.gysz.

Gyógyszer	* Aszkorbinsav
Gyógyszerforma	* C-vitamin Inj.
Beadási út	* IV
Adag	* 1000 mg
Max. adag	
Bázis oldat	0,9% NaCl Normál sóoldat
Bázis térfogat	100 ml
Gyakoriság	* Naponta 3X
Rendelői utasítások	
Napok száma	
Beadások száma	
Indítás	2021.05.17. 14:16
Leállítás	
Ütemezés idő	
Ütemezés 1	
Ütemezett idő	1:00
Ütemezés 2	
Ütemezett idő	9:00
Ütemezés 3	

Idő és dátum

Idő: 14:16 2021.05.17.

Óra:	Perc:
15:00	2021.05.14.
16:00	2021.05.14.
17:00	2021.05.14.
18:00	2021.05.14.
19:00	2021.05.14.
20:00	2021.05.14.
21:00	2021.05.14.
22:00	2021.05.14.
23:00	2021.05.14.
0:00	2021.05.15.
1:00	2021.05.15.
2:00	2021.05.15.
3:00	2021.05.15.

OK Mégse

Befejezés Mégse

Itt is érdemes időt módosítani, hogy ugyan késve, de megkaphassa a beteg az aznapi első adag gyógyszert. Itt a „Befejezés”- re kattintva beírja a rendeléseket

Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súgó Judit Gubányi

Monitor paraméterek Folyadéknap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevétele Gyógyszerek áttekintése Vizitrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények

Allergiák: Spec. állapot vércsoport: • Dg: • ; • ; • ; • ; • ; • ; • Study no.:

Vizitrendelési jegyzőkönyv : Mind	2021.05.16.	2021.05.17.	2021.05.18.	2021.05.19.
[24 óránként] Közvetlen orvosi bevitel	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59
Aszkorbinsav 1000 mg IV Naponta 3X				
Colecalciferol tbl Tabletta 2000 E Naponta 1x reggel				
CVK behelyezése Amint lehet				
Dexamethazone (Dexa) 6 mg in 100 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat ; 100 ml				
Enoxaparin (Clexane) 60 mg SC 12 óránként				
Favipiravir tbl (Favipiravir) Tabletta 1600 mg Naponta 2X első napi adag 2x1600mg				
[Favipiravir tbl (Favipiravir) Tabletta 600 mg Naponta 2X második naptól adag 2x600mg]				
Isolyte				
Isolyte @ 80 ml/óra				
Képpalkotó vizsg: Mellkas Röntgen Amint lehet CVK helyzete? Pneumonia...				
Laboratóriumi v: Na, K, Ca, CN, Kreat, Vk, Vg,...				
Laboratóriumi v: Na, K, Ca, CN, Kreat, Vk, Vg,...				
Metamizole (Algopyrin) 1000 mg in 2 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat max napi 2X; 2 ml				
Pantoprazol (Controloc) 40 mg IV 12 óránként				
Paracetamol (Perfalgan) 1000 mg in 100 ml Gyári oldószer Maximum 3x naponta!; 100 ml				
[Remdesivire (Remdesivir) 100 mg in 250 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat MÁSODIK NAPTÓL 100 mg lassú...; 250 ml]				
Remdesivire (Remdesivir) 200 mg in 250 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat ELSŐ DÓZIS 200 mg lassú bólus...; 250 ml				
Sufentanyl 50 µg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat ; 50 ml				
Tiamin (B1 vitamin) 200 mg IV Naponta 2X				

Amíg nincs mentve a rendelés, addig **betűi rózsaszínűek**. Itt még ilyenkor van mód módosításra, például lehet törölni azt, ami nem kell.

A többi panelen (égett beteg, hasi műtét, stb.) gyógyszer nincs, ott csak laborokat és vizsgálat kéréseket ad be a rendszer, a többit kézzel kell beírni.