

A myocardialis ischaemia különböző megjelenési formáinak EKG jelei

**Dr. Kenyeres Péter
PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika**

2025.

Myocardialis ischaemia

- a myocardium oxigénkínálata elmarad az oxigénszükségletéhez képest,
- aerob metabolizmus az energetikailag kedvezőtlen anaerob irányba tolódik el

Ischaemiás kaszkád:

1. pH csökkenése, laktát és K⁺ ion koncentráció növekedése az ischaemiás területet drenáló vénás vérben
2. diastolés diszfunkciója
3. systolés diszfunkció (hypo- akinesis, csökkent pumpafunkció)
4. elektromos zavar (repolarizációs eltérések, ingerképzési és vezetési zavarok) (ST-T eltérések, QRS morfológiai változás, ritmuszavarok, blokkok)
5. ischaemiás fájdalom: angina
6. nekrosis (elektromos ablak - patológiás Q, átszakadás, hegszövet képződés - aneurysma)

A prezentációban bemutatott EKG regisztrátumok a „Life in the Fastlane” internetes portálról származnak.

<https://litfl.com/myocardial-ischaemia-ecg-library/>
<https://litfl.com/ecg-library/>



Ischaemia EKG jelei

- ST szakasz változásai
- T hullám változásai
- QRS változásai
- U hullám inverziója
- Ritmuszavarok



Az EKG eltérések mindig a tünetekkel (angina) együtt értékelendők!

Az EKG változások dinamikáját nyomon kell követni („mozog az EKG!”)

- változás régi EKG-hoz képest
- változás a panaszok függvényében
 - új eltérések megjelenése/regressziója
 - terápia hatékonyságának lemérése

ST szakasz változásai

- leggyakrabban keresett eltérés
- terápiás stratégia meghatározója (STEMI)
- a sérült terület nyugalmi depolarizációja miatt az alapvonal eltolódik
- az ST szakasz a valódi izoelektromos vonal



STEMI

ST elevatio:

- transmuralis sérülés: nagy kiterjedésű terület perfúzió-kiesése, nekrozissal fenyeget
- epicardialis coronaria ág okklúziója
- mielőbbi revaszkularizáció (ne várj a troponinra!)
- erős lokalizációs érték: utal rá, hogy melyik terület érintett

Ischaemiára utaló ST elevatio definíciója:

- újkeletű ST elevatio a J pontnál
- legalább két összetartozó elvezetésben
- nagysága
 - V2-3-ban: ≥ 2 mm 40 év feletti férfi
 $\geq 2,5$ mm 40 év alatti férfi
 $\geq 1,5$ mm nőben
 - ≥ 1 mm minden más elvezetésben

Prinzmetal angina (coronaria spasmus):


- STEMI-hez nagyon hasonló kép, csak EKG alapján nem különíthető el
- átmeneti eltérés, spontán/vasodilatátorra szűnik
- nekrozist nem okoz

Vérellátás és lokalizáció

-150° aVR

-30° aVL

0° I




120° III

90° aVF


60° II

STEMI-ben látható egyéb EKG elváltozások evolúciója

- A. Normál EKG AMI előtt
- B. Hyperakut T -T-hullám amplitúdó és szélesség megnő (lehet ST eleváció is)
- C. Jelentős ST eleváció
- D. Pathológiás Q; kisebb ST eleváció, terminális T hullám inverzió
- E. Pathológiás Q; T inverzió
- F. Pathológiás Q; pozitív T



ST elevatio myocardialis infarktuban



Konvex, konkáv, ferde egyenes...

Anterior STEMI

LAD elzáródása - különböző magasságokban
anterior fal, septum elülső-felső 2/3
rosszabb prognózis, malignus ritmuszavarok

Precordalis (V1-6) és magas laterális (I, aVL) elvezetések érintettsége

S1 ág: septum basalis része, Tawara szárok (aVR, V1)

D1 ág: magas laterális régió (I, aVL)

Reciprok eltérések lehetnek inferior (II, III, aVF) elvezetésekben

Szeptális = V1-2


Anterior = V2-5

Anteroszeptális = V1-4

Anterolaterális = V3-6, I + aVL


Extenzív anterior / anterolaterális = V1-6, I + aVL

Áthajló (wraparound) LAD esetén inferior ST elevatio is lehet




Hyperakut anteroszeptális STEMI

- V1-4 ST elevatio
- V2-4 hyperakut csúcsos T-k
- V1-2 Q-hullám
- enyhe ST elevatio I, aVL- ben is
- III reciprok ST depressio



Anterior STEMI


- V2-5 ST elevatio, Q hullám
- enyhe ST elevatio I, aVL- ben is
- III reciprok ST depressio



Akut extenzív anterior STEMI


- V2-6, I, aVL ST elevatio
- II, III, aVF reciprok ST depressio

-
- RHYTHM STRIP: II
25 mm/sec; 1 cm/mV




Extenzív anterior STEMI

- masszív ST elevatio V1-6 és I, aVL-ben (sírkő mintázat)
- II, III, aVF reciprok ST depresszió
- proximális LAD elzáródás, nagy kiterjedésű infarktus
- nagy valószínűséggel kardiogén shock és halál



Anterior-inferior STEMI

- áthajló (wraparound) LAD
- ST elevatio precordalis és inferior elvezetésekben
- hyperakut T-k V1-4 ben
- Q hullám kialakulása III-AVF és V1-3-ban



LAD eredési elzáródás (S1-től proximalisan)

- újkeletű JTSZB
- aVR, V1-2-(3) ST elevatio


Lateralis STEMI

LAD és Cx (CxOM, LAD-D, IM) területi elzáródások okozhatják

- anterolateralis: LAD elzáródás
- izolált (magas laterális): kisebb ág: D1, OM, IM elzáródása
- inferolateralis, posterolateralis: Cx elzáródás


EKG jelek:

- I, aVL, V5-6 elvezetések érintettsége
- inferiorban reciprok ST depresszió (I, aVL ST elevatio esetén)




Magas laterális STEMI

- D1 elzáródás
- ST elevatio I-aVL-ben
- enyhe ST elevatio V5-6-ban is + hyperakut T-k
- reciprok ST depressio II, III, aVF-ben
- V1-3 ST depressio (anterior ischaemia, esetleg posterior STEMI tükörkép jele)



Anterolaterális STEMI

- ST elevatio V1-6 és I, aVL-ben is
- reciprok ST depressio III, aVF-ben
- Q hullámok V2-4-ben, R redukció V5-6-ban
- proximális LAD elzáródás



Infero(postero)laterális STEMI

- ST elevatio V5-6-ban és II, III, aVF-ben
- ST depresszió V1-3-ban (posterior STEMI tükörkép jele)
- proximális Cx elzáródás

Inferior STEMI

- általában jobb domináns RCA elzáródás (80%)
- ritkábban bal domináns Cx elzáródás (18%)
- ritkán áthajló (wraparound) LAD elzáródása


Általában jobb prognózisú

Együtt járhat:

- jobb kamrai infarktus (40%, RCA elzáródás)
- posterior infarktus
- sinus bradycardia, sinus arrest (proximális RCA elzáródás)
- AV blokk (AV csomó ischaemia vagy vagotonia)


EKG jelek:

- II, III, aVF-ben ST elevatio
 - RCA elzáródás: STE III > II (medialisabb terület)
 - jobb kamrai infarktus (STE aVR, V4R)
 - I, aVL-ben reciprok ST depressio
 - Cx elzáródás: STE III = II
 - nincs I-ben ST depresszió
 - inkább I, aVL, V5-6 ST elevatio lehet inferolateralis érintettségénél




Inferior STEMI

- jelentős ST elevatio II-III-aVF-ban
- STE III > II
- reciprok ST depressio aVL-ben
- ST elevatio V1-2-ben: jobbkamrai infarktus gyanúja



Posteroinferior és csúcsi STEMI


- masszív ST elevatio II-III-aVF-ben
- reciprok ST depressio I-aVL-ben
- ST elevatio V5-6-ban (csúcsi érintettség)
- reciprok ST depressio V1-3-ban (posterior érintettség)
- domináns RCA occlusio



Szubakut inferior STEMI

II, III, aVF-ben

- Q hullám képződés
- kezdődő T inverzió
- reziduális ST elevatio





(Postero)inferior STEMI + III. fokú AV blokk és junkcionális pótritmus

Posterior STEMI


- RCA vagy Cx elzáródása
- hagyományos 12 elvezetéses EKG nem reprezentálja, így könnyű elnézni.
Lateralis ill. inferior infarktusnál gondolni kell rá!

V1-3-ban tükörkép elvezetések láthatóak

- horizontális ST depresszió
- magas, széles R hullámok (V2 domináns R)
- pozitív T- hullámok




V7-9 (dorzális) elvezetések:
kisebb amplitúdók - 0,5 mm STE is
diagnosztikus



Inferolateralis STEMI...


- ST elevatio I-V5-6-ban és II, III, aVF-ben
- Emellett V1-3-ban ST depressio
pozitív R hullám
pozitív T




Infero-postero-lateralis STEMI

Jobb kamrai infarktus


- inferior STEMI-k 40%-ánál társul. Keresni kell a jeleit!
- preload szenzitív, nitrát kerülendő
- ST elevatio V1-ben
- STE V1 > V2, vagy STE V1 és STD V2
- STE III > II
- jobb oldali elvezetések felhelyezése (V3R-V6R)





Inferior STEMI

- ST elevatio II-III-aVF-ban
- ST depresszió I-aVL-ben
- STE III > II
- És ST elevatio V1-2-ben




Jobb kamrai infarktus


ST elevatio V4R-ben

STEMI ekvivalens eltérések


Kiterjedt ST depressió, főleg I, II, aVL, V4-6 elvezetésekben
+ ST elevatio aVR-ben

- főtörzs elzáródás (kritikusan beszűkült keringés)
- súlyos háromérbetegség
- proximalis LAD occlusio (S1-től proximalisan) szintén okozhat aVR-ben ST elevatiót (anterior STEMI)
STE aVR > V1: főtörzs elzáródásra utal





Ez STEMI!!!




De Winter T hullám

- anterior STEMI ekvivalens (akut LAD elzáródások 2%-a)
- nem ismerik fel, alulkezelés

A precordiális elvezetésekben

- nincs ST elevatio
- 1 mm-t meghaladó aszcendáló ST depressio látszik
- magas, prominens, szimmetrikus T hullámok látszanak
- aVR 0,5-1 mm ST elevatio

Típusos STEMI kép előzheti meg, vagy követheti




Wellens szindróma

V2-3-ben mély, negatív vagy poz-neg. T hullámok látszanak
anginás panaszok mellett


Kritikus LAD szűkület, rövid időn belüli teljes LAD okklúzió előjele
Nem STEMI, de hamarosan az lesz...


Vagy már el is kezdődött, csak még csiki-csukizik az ér




Wellens A típus


Wellens B típus









45 percnyi prehospitalis EKG. Középkorú nő mellkasi fájdalommal.




Antero(lateralis) STEMI képe




Panaszok enyhülnek. ST elevatio csökken. Wellens A kép




Újabb mellkasi fájdalom. T pseudonormalizáció, újabb anterior ST elevatio



Anterior STEMI képe



Panaszok enyhülnek. ST elevatio csökken



Majd T inverzió, Wellens A kép

A későbbiekben kamrafibrillatio lépett fel, defibrillatio sikertelen volt. Mechanikus kompressziók mellett katéterezés, 100% LAD elzáródás intervenciója. Ezután sikeres cardioversio. A beteg felépült

Amikor a repolarizáció korlátozottan értékelhető

- bal Tawara szár blokk
- jobb Tawara szár blokk
 - az esetek többségében lehetővé teszi a repolarizáció megítélését
 - általában a jobb precordalis (V1-3) elvezetésekben okoz szekunder repolarizációs zavart
 - néha ez kiterjedtebb is lehet...
- kamrai pacemaker


Folyamatosan fennálló ischaemiára utaló tünetek és BTSZB esetén (akár újkeletű, akár régi) STEMI-ként kell eljárni.

Ha folyamatosan fennálló ischaemiára utaló tünetek mellett repolarizáció értékelését kiterjedten zavaró JTSZB látszik, STEMI-ként kell eljárni.

Ami további gyanújel lehet:

BTSZB esetén látott QRS és szekunder repolarizációs eltérések (elvárt diszkordancia):

- V1-3-ban: neg. főlengés, ST elevatio, poz. T
- I, aVL, V5-6-ban: pozitív főlengés, ST depressio, neg. T




Abnormális eltérések:

(Módosított) Sgarbossa kritériumok:


- pozitív főlengéssel konkordáns >1 mm ST elevatio
- V1-3-ban konkordáns >1 mm ST depresszió
- negatív főlengés mellett eltúlzott diszkordáns ST elevatio (>5 mm, vagy $>25\%$ -a az S hullámnak)

Jobb kamrai pacelés mellett is igaz, bár kisebb specificitással





Konkordáns ST elevatio aVL-ben



Konkordáns ST depressio V2-5-ben

ST depresszió

Gyengébb lokalizációs érték!

Ischaemiára típusos, ha



- Horizontális vagy deszcendáló jellegű, J pontnál ≥ 0.5 mm depresszió, két vagy több összetartozó elvezetésben

≥ 1 mm depresszió még típusosabb, és rosszabb prognózisú


≥ 2 mm depresszió három vagy több elvezetésben már NSTEMI-t valószínűsít

Nem specifikus:


- aszcendáló ST depresszió
- 0.5 mm-nél kisebb ST depresszió



Az ST depresszió ne vonja el a figyelmet a korábban említett STEMI (ekvivalens) esetekről!



Kiterjedt ST depressziók
ST elevatio aVR-ben
Főtörzs elzáródás, STEMI!



II, III, aVF ST depresszió

de ezek reciprok eltérések a magas lateralis STEMI miatt (aVL ST elevatio)!

A V2-4 is gyanús: anterior ischaemia vagy posterior STEMI

T hullám eltérések

Hyperakut T hullámok:

Magas, széles alapú szimmetrikus T hullámok kettő vagy több összetartozó elvezetésben - STEMI bevezető szakaszában

T inverzió

- legalább 1 mm mély
- két vagy több összetartozó elvezetésben, ahol domináns R hullám látszik ($R/S > 1$)
- dinamikus: korábbi EKG-n nem látszott, vagy időben változó jellegű

Wellens syndroma

V2-3 mély negatív vagy poz-neg T hullám

Ischaemiát jelölhet, de nem specifikus eltérés:

- 1 mm-nél sekélyebb T inverzió
- lapos T hullám

Az izolált (konkomittáló ST eltérés nélkül) látott T hullám inverzió nem utal zajló ischaemiára, hanem az ischaemia lezajlása után alakul ki.




- szimmetrikus negatív T hullám (coronaria T)
- társulhat negatív U hullámmal

Myocardialis infarktus után gyakran napokon-heteken belül normalizálódik (az infarktus területén belüli gyógyhajlamra utal), de néha krónikusan (egy éven is túl) fennmarad.

T hullám pseudonormalizáció

Korábban ismert invertált T hullám visszafordulása mellkasi fájdalmak mellett nagyon gyanús ischaemára - akármi is volt a korábbi T inverzió oka (infarktus, szárblokk, pacemaker, preexcitatio stb.)

Infarktus következtében kialakult T inverzió pseudonormalizációja reinfarktusra utalhat!




U hullám inverziója

U hullám normálisan konkordáns a T hullámmal, annak <25%-a
Ha diszkordánsan jelenik meg, és ez mellkasi fájdalomhoz társul, az igen specifikus myocardialis ischaemiára

- instabil angina
- kezdődő infaktus

Egyéb U hullám inverzióval járó állapotok (mellkasi fájdalom nélkül)

- hypertonia
- billentyűbetegség
- congenitalis szívbetegségek
- cardiomyopathia
- hyperthyreosis




Patológiás Q hullám

- elektromos ablakképződés kiterjedt myocardialis nekrózis esetén
 - általában STEMI esetén - transmuralis elhalás
 - nagy kiterjedésű NSTEMI esetén is lehet
- a szemközti fal depolarizációjának (R hullámának) tükörkép jele
- Az ST elevációval azonos lokalizációjú
- tipikusan tünetek jelentkezése után 6-16 h órával alakul ki (néha előbb)
- idővel csökkenhet a Q amplitudó, inferior infarktus után 30%-ban el is tűnik.

Definíció:


- V2-3-ban: >20 ms Q hullám, vagy QS komplex
- többi elvezetésben: >30 ms és >1 mm mély, vagy QS komplex két vagy több összetartozó elvezetésben
- kivételek:
 - kis q előfordulhat aVL, V5-6-ban (szeptális q)
 - QS elképzelhető V1-ben (elektróda pozíció hiba, vagy hiányzó r hullám)
 - izoláltan III-ban előfordulhat mély, légzéssel összefüggő Q (pozícionális Q), illetve bal tengelyállás esetén légzéstől független q.
- patológiás R: >40 ms R V1-2-ben, R/S>1, konkordáns pozitív T



Anterior STEMI: patológiás Q hullámok kialakulása

Lezajlott infarktus:

- normalizálódott ST-k
- patológiás Q-k
- coronaria T-k



R hullám változása

R redukció: myocardium vesztes következtében az R hullám amplitúdója csökken


Gyenge R hullám progresszió: V3-van $R \leq 3$ mm

- korábbi anteroseptális infarktus

- bal kamra hypertrophia

- rossz elektróda felhelyezés

- normál variáns



Ischaemia egyéb következményei: ritmuszavarok





Infarktust követően, vagy krónikus ISZB-hez kapcsolódóan

Infarktus akut/szubakut szakában

- kamrai extrasystolia
- accelerált idioventriculris ritmus / lassú kamrai tachycardia (50-100/min)
- monomorf/polimorf, tartós/nem tartós kamrai tachycardia
- kamrafi brillatio
- malignus ritmuszavarok általában az első 48-72 órában jelentkeznek (monitorozás!)
- pitvari extrasystolia
- pitvarfi brillatio
- AV blokk (I., II., III. fokú)
- sinus bradycardia, SA blokk, sinus arrest
főleg RCA elzáródásnál

Krónikus ISZB-ben, hegszövetben, jelentősen csökkent EF mellett

ST elevatio differenciáldiagnosztika



STEMI ↑



LV Aneurysm



Brugada


Nem STEMI →




Pericarditis



BER




LBBB




Pericarditis

- konkáv, nyeregszerű ST elevatio kiterjedten, nem egy coronariát reprezentáló eltérésekben
- PR depressio
- aVR-ben, V1-ben reciprok ST depressio és PR elevatio



Benignus korai repolarizáció


- enyhe konkáv ST elevatio és magas T hullámok a precordalis és inferior elvezetésekben
- J pontnál lehet egy kis bevágás - horog-minta
- főleg alacsonyabb pulzusnál látható, tachycardiánál eltűnhet
- normál variáns fiatal egészséges pácienseknél




Bal Tawara szár blokk

QRS és szekunder repolarizációs eltérések
(elvárt diszkordancia):


- V1-3-ban: neg. főlengés, ST elevatio, poz. T
- I, aVL, V5-6-ban: pozitív főlengés
ST depresszió, neg. T






Kamrai pacemaker

- BTSZB-nek megfelelő kép (I, aVL pozitív főlengés)
- elvárt diszkordancia




Bal kamra hypertrophia és strain

BTSZB-hez hasonló repolarizációs eltérések




Bal kamrai aneurysma (korábbi myocardialis infarctus maradványtünete

- reziduális ST elevatio
- Q hullám
- T inverzió




Brugada syndrome


- (inkomplett) JTSZB
- V1-2 ST elevatio



Agyi sérülés, intracranialis nyomásfokozódás

- coronaria ellátási területeket nem respektáló, kiterjedt ST, ill. bizarr T hullám eltérések kísérhetik
- konkáv ST elevatiók






Takotsubo cardiomyopathia

- újkeletű ST-T eltérések (változatos megjelenéssel)
- típusos regionális falmozgászavar (csúcsi dilatáció és akinesis)
- mellkasi panaszok, troponin emelkedés
- általában nagy érzelmi megrázkódtatást követően jelentkezik
- STEMI-től nem különíthető el biztonsággal, STEMI protokoll követendő


További bizarr ST-T eltérések előfordulhatnak

- hyperkalaemia
- hypokalaemia
- hypercalcaemia
- hypothermia


Más a klinikum...




Hyperkalaemia



Hypokalaemia



Hypercalcaemia



Hypothermia


ST depressio differenciáldiagnosztika

- bal Tawara szár blokk
- pacemaker,
- balkamra hypertrophia és strain

- jobb Tawara szár blokk
- jobbszívfél terhelés, strain: jobb kamra hypertrophia
tüdőembolia


- digoxin hatás

- hypokalaemia




Jobb kamrai hypertrophia

- jobb tengely, szélesebb QRS (JTSZB is lehet)
- V1-ben domináns R hullám, V5-6-ban domináns S hullám
- jobb kamrai strain (ST depresszió és neg. T) jobb precordalis (V1-3) és gyakran inferior (II-III-aVF) elvezetésekben
- P pulmonale



Digoxin hatás

- descendáló, sajkaszerű ST depresszió
- lapos negatív, vagy bifázisos T



Supraventricularis tachycardia mellett jelentkező ST eltérések

- lehet akut ischaemia következménye (extrém frekvencia, vagy beszűkült coronaria keringés melletti terhelés)
- lehet pusztán elektromos jelenség is ischaemia nélkül
- cardioversio/frekvenciakontroll után klinikum alapján kell dönteni

T hullám differenciál diagnosztika


Hyperkalaemia vs. hyperakut T hullám

T inverzió

- gyermek
- perzisztáló juvenilis T hullám mintázat
- BTSZB
- bal kamra hypertrophia és strain
- hypertrophias cardiomyopathia
- JTSZB
- jobb kamra hypertrophia és strain
- tüdőembolia
- intracranialis nyomásemelkedés


Lapos T-k

- hypokalaemia




Hyperkalaemia

- keskeny alapú, szimmetrikus, csúcsos T-k



Gyermek EKG



Hypokalaemia

Köszönöm a figyelmet!!!